

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

## ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE 37 20 56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

Supplément au bulletin N° 32 de Mai 1963

29 Mai 1963

page 63

### AVERTISSEMENTS

#### VIGNE

**MILDIU** - Effectuer un traitement dès réception dans les conditions suivantes:

	: Seulement les parcelles portant	:	
	: habituellement des taches précoces	:	Toutes parcelles
Ain	: en entier, sauf région 50	:	région 50
Ardèche	: régions 141 et 151	:	Néant
Drôme	: régions 124 et 135	:	région 123
Isère	: régions 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,	:	régions 102, 112, 114,
	: 110, 111, 113, 117, 118, 119 et 120	:	115 et 116
Loire	: Néant	:	en entier, sauf région 12
Rhône	: Néant	:	en entier
Savoie	: régions 81, 82, 83, 85, 90 et 91	:	régions 86, 87, 88 et 93
Hte Savoie	: Néant	:	en entier

Dans les régions de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire non encore visées, attendre un avis ultérieur pour appliquer le 1er traitement.

**BLACK-ROT** - Dans le vignoble de Savoie seulement et à l'exception du versant des Abymes, étendre les traitements à l'ensemble des parcelles avant le 3 juin. Sur les parcelles déjà traitées, maintenir la même cadence de traitements.

**TORDEUSES DE LA GRAPPE** - Appliquer le 1er traitement dans les conditions suivantes:

	: Produits à caractère	:	Produits à caractère
	: préventif	:	curatif
Vallée du Gier, vallée du Rhône au	: déconseillé	:	
sud de Lyon, ensemble de la Drôme	: (éclosions très échelonnées)	:	4 au 8 juin
et de l'Ardèche	: 1er au 4 juin	:	9 au 13 juin
Autres régions	:	:	

### INFORMATIONS

**OIDIUM** - Poursuivre la protection des cépages sensibles

**CIGARIER** - Ce charançon qui roule feuilles et grappes en "cigares" doit être détruit dès son apparition par une pulvérisation à base d'un insecticide organique de synthèse.

P361

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - En toutes régions, le dernier traitement devra être renouvelé dans la période du 1er au 6 juin, plus ou moins tôt suivant la date du traitement précédent et l'importance des pluies survenues entre temps.

CARPOCAPSE (pommier et poirier) - Etendre ou renouveler le 1er traitement avant le 7 juin dans les régions suivantes:

AIN 40, 41, 42, 44, 46 et 52

LOIRE 9 et 12

ARDECHE 141, 142, 143, 145, 147 et 152

RHONE 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31 et 35

DROME 121, 122, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133 et 134

SAVOIE 81, 85, 87 et 89

ISERE 101, 102, 103, 105 et 121

HTE SAVOIE néant

TORDEUSE ORIENTALE (pêcher en pépinière) - Renouveler le 1er traitement au bout de 12 à 15 jours.

INFORMATIONS

MOUCHE DE LA CERISE - On peut dès maintenant envisager d'appliquer le traitement insecticide au Diméthoate dès que la couleur des cerises virera au rouge; si l'on désire utiliser un autre insecticide (D.D.T., Parathion ou Diazinon), effectuer ce traitement au moins une semaine plus tôt.

ANTHRACNOSE DU CERISIER (Coccomyces hiemalis) - Un traitement est nécessaire dès réception à l'aide d'un fongicide de synthèse contre cette maladie qui cause des dégâts importants depuis 1961.

INFORMATIONS

PETITS FRUITS

DIDYMELLA - Poursuivre les traitements fongicides à 10 ou 12 jours d'intervalle jusqu'à l'approche de la maturité des premiers fruits.

BYTURUS (ver de la framboise) - Appliquer un traitement au toxaphène à 75gr/hl de matière active dès les premières journées chaudes.

SESIE DU GROSEILLIER - Prévoir également, dès les premières journées chaudes, une pulvérisation abondante à base de D.D.T., de Lindane ou de Parathion.

AVERTISSEMENTS

GRANDE CULTURE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Un premier traitement ne devra être appliqué dès réception que dans les limites suivantes:

Au-dessous de 400m d'altitude dans les régions suivantes:

AIN 43,44 ISERE: 102 LOIRE: 4,5,6,7,8,9,11,14,25,28 RHONE: en entier

Dans les autres régions, attendre un avis ultérieur.

INFORMATIONS

NEGRIL DE LA LUZERNE - Surveiller l'apparition de ce ravageur dont la larve noire ravage les luzernières surtout dans les régions limitrophes de la Drôme et de l'Isère, appliquer alors un traitement à base de pyrèthrine sur les fourrages à consommer verts, à base de D.D.T., Dieldrine, Lindane ou Toxaphène sur les fourrages à sécher.

DORYPHORE - Renouveler les traitements en fonction de la rapidité de croissance du végétal, du lessivage des produits ou des nouvelles éclosions de larves.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux  
A. PITHIoud

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles  
P. LATARD